

Wichtige Information zur CORONA-IMPfung für unsere Patienten

- Lesen Sie aufmerksam das [Aufklärungsblatt](#) zur Schutzimpfung (Achtung: je nach Impfstoff unterschiedliche Ausführungen). Das Formular bitte in einfacher Ausführung unterschreiben und mit zur Impfung bringen
- Das [Anamnese-Formular](#) und die [Einwilligungserklärung](#) bitte in einfacher Ausführung ausfüllen, unterschreiben und zur Impfung mitbringen
- Ihren [Impfausweis](#) zur Impfung mitbringen
- Bitte weisen Sie uns vor der Impfung darauf hin, falls es in der Vergangenheit schon einmal zu einer heftigen Impfreaktion gekommen ist
- Nach der Impfung wird eine Nachbeobachtungszeit von mindestens 15 Minuten empfohlen, bei Einnahme eines Gerinnungshemmers (z.B. Marcumar, Xarelto, Lixiana oder Eliquis) sogar bis zu 30 Minuten. Falls wir Ihnen nach der Impfung keinen Platz in der Praxis anbieten können, halten Sie sich bitte in unmittelbarer Nähe der Praxis auf, damit Sie bei Auftreten von Beschwerden sofort mit uns Kontakt aufnehmen können
- Falls Stunden nach der Impfung grippeähnliche Beschwerden wie Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen oder Schmerzen an der Einstichstelle auftreten, empfehle ich die Einnahme von 2 Tabletten Paracetamol (je 500 mg), wobei die Einnahme nach jeweils 8 Stunden wiederholt werden kann
- Notieren Sie sich den Termin zur Zweitimpfung (BioNTech nach 6 Wochen, AstraZeneca nach 12 Wochen!)